

# Bamitol<sup>M.R.</sup>

*Ungüento mamario (aplicación tópica)*



## Fórmula:

Salicilato de metilio .....	2 g
Alcanfor .....	1 g
Acido carbólico.....	3 g

## Descripción:

Ungüento emoliente de la glándula mamaria, auxiliar en golpes, moretones y procesos inflamatorios de la ubre, que protege y suaviza la piel devolviéndole su elasticidad.

Por su acción rubefaciente está indicado en el reumatismo y otras afecciones de las articulaciones.

## Vía de administración:


Tópica

## Dosis:

**Bamitol<sup>M.R.</sup>** se aplica en forma abundante sobre la zona deseada, seguido de un masaje gentil, repitiendo esta operación 2 a 3 veces al día.

## Indicaciones:

**Bamitol<sup>M.R.</sup>** se emplea especialmente en todas las afecciones inflamatorias, principalmente en aquéllas de la glándula mamaria; aumenta la circulación, lo cual lo hace un excelente coadyuvante en el tratamiento de las mastitis y del edema posparto.



El efecto desinfectante de **Bamitol<sup>M.R.</sup>** además de bactericida y analgésico, ayuda al proceso curativo de heridas y úlceras, mejorando la cicatrización.

En los procesos artríticos, reumáticos y otras afecciones de las articulaciones, la aplicación de **Bamitol<sup>M.R.</sup>** contrarresta el proceso inflamatorio (acción antiflogística) logrando recuperar la movilidad rápidamente. Los esguinces, distensiones tendinosas y contusiones se resuelven satisfactoriamente con el empleo de **Bamitol<sup>M.R.</sup>**.

### Ungüento emoliente y rubefaciente

Auxiliar en los procesos inflamatorios de la ubre, aumenta la circulación y protege y suaviza la piel de la ubre.

### Efecto rubefaciente

Ayuda a la resolución de afecciones de las articulaciones como reumatismo o inflamaciones.

### Efecto desinfectante

Ayuda a la curación de heridas y úlceras, mejora la cicatrización.

### Acción antiflogística

Contrarresta el proceso inflamatorio en procesos artríticos y reumáticos, o en esguinces, distensiones o golpes. Contribuye a la recuperación de la movilidad.

### Inocuidad

Se puede aplicar el producto 2 a 3 veces al día sin que el producto cause efectos secundarios.

"Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V."

