

Rodilon^{M.R.} Blue Bloque



Rodenticida anticoagulante monodósico para control de roedores ratas y ratones domésticos en instalaciones pecuarias (Cebo parafinado)

Descripción:

Rodenticida anticoagulante de dosis única, para el control de roedores plaga en instalaciones pecuarias (fórmula parafinada especialmente resistente en sitios húmedos). **Rodilon^{M.R.} Blue Bloque** es un potente rodenticida que controla eficazmente a los roedores plaga. **Rodilon^{M.R.} Blue Bloque** posee las siguientes características:

Fórmula:

Composición porcentual” Ingrediente activo:

% en peso.

Difetialona: 3-[(1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftil]-4-hidroxi-1-benzoti-in-2-ona.....0.0025%
(Equivalente a 0.025 g de i.a/Kg).

Ingredientes inertes:

Parafina, colorante, conservador, edulcorante, saborizante artificial, harina de trigo, mijo, maíz quebrado, fécula de maíz y cacahuate molido:.....
.....99.9975%
Total 100.0000

Indicaciones:

Rodilon^{M.R.} Blue Bloque debe colocarse en los lugares donde haya rastros de actividad de roedores inclusive en aquellos sitios con alta humedad donde otros cebos se desbaratan y descomponen rápidamente.

Dosis y vía de administración:

Colocar de 4-6 bloques sujetos por un alambre suspendido en las alcantarillas, debajo de slats, alrededor de fosas sépticas, directo en madrigueras y en general en todas las áreas externas y sistemas de drenaje de las instalaciones pecuarias donde exista actividad de roedores o si lo prefiere coloque los bloques cada 5-10 metros formando cinturones periféricos a manera de “cordón perimetral”. En áreas pecuarias se pueden colocar los bloques en techos de casetas y edificios; se recomienda fijarlos con clavos o alambres para controlar a la rata de los tejados.

Plaga	Grado de infestación	No. de bloques por punto de cebado	Observaciones
RATAS Rata de las alcantarillas: <i>Rattus norvegicus</i> Rata negra: <i>Rattus rattus</i>	Ligera a moderada	2 a 4	Colóquese la cantidad de cebo indicada por punto de cebado o directo a madriguera cada 5 a 10 metros en establos, caballerizas, zahurdas, granjas avícolas, granjas acuícolas, criaderos, zoológicos.
RATONES Ratón doméstico: <i>Mus musculus</i>	Severa	1 a 2	

Presentación:

Cubeta 9 kg.

“Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V.”

